

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore**SOLKET infiammazione e dolore 0,16% spray per mucosa orale**

Ketoprofene sale di lisina

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è SOLKET infiammazione e dolore e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare SOLKET infiammazione e dolore
3. Come usare SOLKET infiammazione e dolore
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare SOLKET infiammazione e dolore
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è SOLKET infiammazione e dolore e a cosa serve

SOLKET infiammazione e dolore spray per mucosa orale contiene il principio attivo ketoprofene sale di lisina, una sostanza che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati "Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei" (FANS), ed è un medicinale stomatologico usato per il trattamento locale del cavo orale.

Solket infiammazione e dolore si usa come trattamento sintomatico di stati irritativo-antinfiammatori anche associati a dolore del cavo oro-faringeo (ad esempio gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza a terapia dentaria conservativa (cura del dente) o estrattiva (estrazione del dente).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare SOLKET infiammazione e dolore**Non usi SOLKET infiammazione e dolore**

- se è allergico al ketoprofene o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6 "contenuto della confezione e altre informazioni");
- se ha sofferto di un problema alla respirazione detto asma bronchiale pregressa.
- se ha una storia di asma bronchiale o di reazioni avverse provocate dall'impiego di altri medicinali antinfiammatori non steroidei come attacchi d'asma, broncospasmo (restringimento dei bronchi, causando difficoltà a respirare), rinite acuta, polipi nasali, orticaria o edema angioneurotico (gonfiore del volto o delle mucose);
- se è in stato di gravidanza, se sospetta una gravidanza o se sta allattando con latte materno (si veda il paragrafo "Gravidanza e allattamento").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare SOLKET infiammazione e dolore.

Chieda consiglio al medico prima di usare Solket infiammazione e dolore se soffre o ha sofferto in passato di asma bronchiale.

L'uso, specie se prolungato, di medicinali topici (per uso locale) potrebbe dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione (allergia). In questo caso interrompa il trattamento e si rivolga al medico per adottare le misure terapeutiche adatte. Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consulti il medico. Non utilizzi Solket infiammazione e dolore spray per mucosa orale per trattamenti prolungati.

Altri medicinali e SOLKET infiammazione e dolore

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni negative con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Non usi SOLKET infiammazione e dolore durante la gravidanza.

Le formulazioni orali (ad esempio le compresse) di ketoprofene possono causare effetti avversi sul feto. Non è noto se ketoprofene comporti il medesimo rischio quando utilizzato sulla pelle.

Allattamento

Non usi SOLKET infiammazione e dolore se sta allattando con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

SOLKET infiammazione e dolore contiene para-idrossibenzoati

Questo medicinale contiene para-idrossibenzoati (metile para-idrossibenzoato e propile-paraidrossibenzoato) che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come usare SOLKET infiammazione e dolore

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Istruzioni per l'uso

- Sollevi la cannula e la introduca in bocca
- Diriga lo spruzzo direttamente verso la zona interessata.
- Prema l'erogatore per permettere la fuoriuscita del medicinale.

La dose raccomandata è: 1-2 spruzzi, fino a tre volte al giorno.

Ogni spruzzo eroga circa 0,2 ml di soluzione corrispondenti a 0,32 mg di ketoprofene sale di lisina.

Attenzione: Non superi le dosi indicate.

Usi solo per brevi periodi di trattamento.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento recente nelle sue caratteristiche.

Se usa più SOLKET infiammazione e dolore di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Solket infiammazione e dolore spray per mucosa orale, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Se dimentica di usare SOLKET infiammazione e dolore

Se dimentica di usare una dose del medicinale, lo faccia appena se ne ricorda, a meno che non sia quasi l'ora di usare la dose successiva.

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:

Molto rari (possono interessare meno di una persona su 10000):

- fenomeni irritativi locali (irritazione della gola);
- fenomeni allergici come gonfiore del viso, in particolare intorno alla bocca e agli occhi, della lingua o della gola (edema angioneurotico); ciò si verifica soprattutto in soggetti con ipersensibilità ai farmaci antinfiammatori non steroidei ("FANS").

Non sono noti effetti indesiderati sistemici.

Nel caso si manifestino effetti indesiderati, consultare il medico.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare SOLKET infiammazione e dolore

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Il prodotto deve essere utilizzato entro 21 settimane dalla prima apertura del flacone. Il prodotto in eccesso deve essere eliminato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene SOLKET infiammazione e dolore

- Il principio attivo è ketoprofene sale di lisina: 100 ml di spray per mucosa orale contengono 0,16 g di ketoprofene sale di lisina, corrispondenti a 0,10 g di ketoprofene.
- Gli altri componenti sono: glicerolo 85%, xilitolo, **metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato**, sodio fosfato monobasico, polossamero, aroma menta, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di SOLKET infiammazione e dolore e contenuto della confezione

Confezione contenente un flacone da 15 ml di soluzione con pompa spray, cannula ed erogatore.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Aesculapius Farmaceutici S.r.l. - Via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia.

Produttore

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Martiri delle Foibe, 1 - Cortemaggiore (PC)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato in: Aprile 2024